Die Cestoden der einheimischen Corviden

Walter Volz

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

42,428

BEQUEST OF

WILLIAM MEM. WOODWORTH

April 24, 1915

Digitized by Google



Digitized by Google

Hakenkranz doppelt, aus 20
Glieder breiter als lang, ältere lan
unregelmäßig alternierend, dem
Cirrusbeutel kurz. Vas deferens
seminalis zu bilden. Hoden im hi
der Zahl. Vagina neben und hin
einem Bogen nach der Mediane,
bilden. Canalis seminalis vagina
Keimstock hirschkornförmig ge
stock. Uterusanlage ventral. T

2. *Taenia undulata* Rud
Haken. Glieder sämmtlich br
unregelmäßig abwechselnd, do
äußerst lang und schmal. Vas
seminalis fehlt. Hoden ca. 10
dorsal vom männlichen Ausfu
minis in der Mitte der Glieder
Dotterstock unpaarig. Schale
versalmusculatur nur in der N

3. *Taenia angulata* Rud
Anatomie sehr ähnlich der
zahlreich am Hinterende
Weinland als Typus des Su
Untergattung nicht, wie Cohn
thut, dem Genus *Diplacant*
Typus des ganzen Genus. T
wurde deshalb der Vertreter
voraussehen kann, mußte
taenia Railliet dem Genus
Stellung einer spätern Syst
nis noch weiterer, näher V
erwähnen, daß die Diagno
trias — *Hymenolepis* aufs
nämlich sehen, daß T. se
in ihrer Anatomie mit de
ständig übereinstimmen,
während Cohn in der Di
gulata, mit 10 Haken m

Wegen der Hakenfor
Zeichnungen von Krabbe,
Kiobenhavn 1869.

Cohn, L., Zur Syste
Parasitenkunde u. Infections

Digitized by Google

Hinterende jeder Proglotis [illegible] die zwei folgenden, ins Genus *Diplacant*

5. *Diplacanthus = Hymenolepis* [illegible] breiter als lang. Geschlechtsöffnunge tomie wie bei *D. serpentulus*. Hode durch ein ziemlich langes Sförmig Cirrusbeutel getrennt. Receptaculum der Vergleichsart

6. *Diplacanthus = Hymenolepis*, Hoden [illegible] innere Vesicula seminali Durchmesser als der Cirrusbeutel und Geschlechtsporen sämmtlich links. Re als bei *D. stylosus*. Anatomie sonst gl

Digitized by Google

Digitized by Google